

UN FUTURO SENZA HPV

Proteggi i loro sogni, scegli la vaccinazione.



Credito: immagine creata con Gemini AI, 2026

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Sanità Pubblica, Epidemiologica e Medicina Preventiva
U.O.S. Profilassi delle malattie infettive e strategie vaccinali
via A. Staiti, 95 - Trapani
0923.543040



COS'È L'HPV?

Il Papillomavirus umano (HPV) è un virus che colpisce sia **uomini** che **donne**.

Le infezioni da HPV sono per lo più transitorie e molte volte asintomatiche.

In alcuni casi, se persistenti e non trattate, possono evolvere in tumori.

COSA PROVOCA?

È causa del **90%** dei **tumori del collo dell'utero** e, in percentuali importanti, di altri tumori (ad es. orofaringe, pene, ano) che interessano sia gli uomini che le donne.

COME SI TRASMETTE?

Per lo più per **via sessuale**. Essendo presente sulla cute dei genitali, l'uso del preservativo riduce molto il rischio di trasmissione ma non lo elimina completamente.

COME PROTEGGERSI?

SCREENING CERVICO-CARCINOMA

Permette di scoprire le lesioni del collo dell'utero prima che evolvano in tumore.

Cosa fare?

Il **PAP TEST** se sei una donna tra i **25 e i 29 anni**.

**ogni
3 anni**

L'**HPV TEST** se sei una donna tra i **30 e i 64 anni**.

**ogni
5 anni**

Le ragazze che hanno completato il ciclo vaccinale anti-HPV prima dei 15 anni saranno invitate per il primo test di screening a 30 anni, invece che a 25.

COME PROTEGGERSI?

VACCINO ANTI-HPV

Insieme allo screening, è lo strumento più efficace contro i tumori HPV-correlati.

Chi può vaccinarsi?

La vaccinazione è fortemente consigliata e gratuita per ragazzi e ragazze dagli 11 anni in su.

Hanno, inoltre, diritto alla vaccinazione gratuita:



UOMINI

Nati dal 2003 o partner di donne con lesioni.

Soggetti con stato di immunodepressione congenita o acquisita.

Men who have sex with men (MSM).



DONNE

Nate dal 1996 o nate prima ma con lesioni CIN2+ e CIN3+

Soggetti con stato di immunodepressione congenita o acquisita.

STRUMENTI DI PROTEZIONE: IL VACCINO

In base all'età in cui si effettua la vaccinazione, cambia il numero di dosi somministrate:

Età I Dose	Schedula dosi
Ragazze e ragazzi da 11 a 14 anni compresi	2 DOSI (0-6 mesi)
Donne e Uomini da 15 anni in su	3 DOSI (0-2-6 mesi)

Ricorda: Se hai interrotto la vaccinazione, ti invitiamo a completarla!

CONTATTI UTILI

Per maggiori informazioni sul **vaccino** e per conoscere il centro vaccinale più vicino:

 **hpv@asptrapani.it**

 **0923.543040** (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00)

Per maggiori informazioni sugli **screening**:

 **screening@asptrapani.it**

 **338.6314817 (SMS/Whatsapp)**

Informazioni utili anche su:

www.vaccinarsi.org – www.asptrapani.it

Altre figure di riferimento a cui potersi rivolgere:

- **Medico di famiglia**
- **Ginecologo**
- **Ostetrica**
- **Centro vaccinale**

FAQ

Il vaccino contro l'HPV può causare l'infezione?

No. È un vaccino composto da alcune particelle simil-virali (VLP), che inducono la risposta immunitaria ma che non possono causare infezioni o malattie correlate all'HPV.

Dove e come si somministra?

Nel muscolo deltoide (braccio). A scuola la somministrazione è a cura del personale sanitario ASP; in alternativa è possibile rivolgersi ad un centro vaccinale, ai Pediatri di Libera Scelta o Medici di Medicina Generale aderenti.

È sicuro?

Sì. Effetti lievi e transitori più frequenti sono dolore/rossore al sito di inoculazione, raramente febbricola, stanchezza, mal di testa. Eventi gravi sono estremamente rari.

FAQ

Raffreddore o antibiotici: si può vaccinare comunque?

La valutazione viene eseguita durante il triage sanitario. La maggior parte delle terapie (es. antibiotici) non controindica la vaccinazione. Occorre segnalare sempre i farmaci al triage; sarà cura del sanitario decidere.

È utile vaccinarsi anche quando si è più grandi?

La vaccinazione è più efficace prima del debutto sessuale, tuttavia i vantaggi si manifestano anche nella fase successiva.

Le ragazze vaccinate devono comunque aderire allo screening in età adulta?

Sì, lo screening è sempre fondamentale per prevenire le patologie tumorali HPV correlate. La vaccinazione non sostituisce lo screening.